

Le Guêpier d'Europe (Mérops apiaster)



Fiche descriptive :

Famille des Méropidés.

Etymologie : du Nom grec Mérops, oiseau qui mange les abeilles, et Apiaster la mélisse, plante visitée par les abeilles.

L 27-29Cm, envergure 44-49Cm

Masque noir barrant l'œil et s'élargissant vers l'arrière, dessus de la tête (calotte) et haut du dos roussâtre, front jaune et bleu, gorge jaune, ventre bleu, plumage multicolore, bec courbé et pointu.

Plume centrale de la queue (rectrices) plus longue que les autres.

Le cri caractéristique doux, flûter, mais audible de loin émit en vol, trahit souvent leurs présences.



Migration :

Les colonies d'Europe occidentale vont passer l'hiver en Afrique de l'ouest. Celles d'Europe centrale et orientale vont en Afrique du sud.

On observe cette espèce migratrice de début mai à fin août et elle est en expansion depuis les années 1990.

Nidification :

Nicheur assez rare et localisé en Nouvelle Aquitaine.

Niche majoritairement en colonie dans des berges ou talus sablonneux, le plus souvent dans des carrières avec des résurgences d'eau et de grands arbres. La présence de fils électriques sert de perchoir.

Les guêpiers creusent des tunnels à hauteur variable de 0,70 à 2,50m terminés par une chambre. En période d'accouplement, le mâle claque des ailes à côté de la femelle, puis exécute les mouvements saccadés de l'accouplement, les plumes dressées à l'arrière de la tête et la pointe des ailes sous la queue.



La nichée est de 5 à 7 œufs en moyenne, couvés pendant 20 à 24 jours. A l'éclosion les jeunes restent entre 20 et 30 jours avant l'envol. Les deux partenaires se relaient au nid le temps de la couvaison.

Régime alimentaire :

Comme son nom l'avance, le guêpier se nourrit de guêpes, d'abeilles et d'autres gros insectes comme les libellules et coléoptères capturés avec précision en vol.

